


ÁRBOL DE DECISIÓN DE EUTANASIA EN GANADO LECHERO

Utilice el siguiente árbol de decisión para determinar si debe llevar a cabo una eutanasia de inmediato.



Dolor: Sensación física desagradable que se produce con diversos grados de intensidad debido a una lesión, a una enfermedad o como consecuencia de un procedimiento médico o de manejo.



PRINCIPALES MÉTODOS DE EUTANASIA RECOMENDADOS


Si no se confirma la muerte después de aplicar un método principal, debe aplicar un método secundario para completar la eutanasia.

1

Disparo usando una arma de fuego apropiada, munición y en una parte anatómica que produzca una interrupción física de la actividad cerebral debido a la destrucción directa del tejido cerebral.

2

Perno percutor (PP) para inducir pérdida de conciencia en combinación con una medida complementaria, tal como desangrado, administración intravenosa de una solución saturada de cloruro de potasio o de sulfato de magnesio, o apuntillado/punción (incrementar la destrucción del tejido cerebral y de la médula espinal) para garantizar la muerte.



Ilustraciones cortesía de J.K. Shearer del Cash Special Euthanizer Kit® para eutanasia de ganado Anim. Welf. 2012; 21: 00-102.

3

Sustancia química barbitúrica intravenosa (IV) que administre un veterinario o agentes anestésicos intravenosos que dejen al animal inconsciente para poder llevar a cabo un segundo paso. Tenga en cuenta que estos animales no deben ser sacrificados.

Las condiciones o situaciones pueden llevar a que un animal se vea comprometido hasta tal punto que la eutanasia debe realizarse de inmediato:

- Período prolongado de abstinencia de fármacos para que no queden residuos en el tejido.
- INCAPACIDAD DE:**
 - Mantenerse sentado en posición erguida con la cabeza en alto
 - Mover o levantar las patas delanteras una vez que haya sido levantado con ayuda
 - Ponerse de pie debido a una fractura catastrófica, traumatismo o enfermedad en los miembros, las caderas o la columna
- SUFRIMIENTO PROVOCADO POR:**
 - Afecciones neoplásicas oculares avanzadas (por ejemplo, cáncer en el ojo).
 - Edad o lesión que hagan que el transporte o la comercialización del animal sean demasiado peligrosos para este
 - Neumonía crónica y dificultad para respirar/falta de aliento.
 - Hinchazón crónica repetida
 - Afecciones sin tratamiento eficaz (p. ej., paratuberculosis o linfoma)
 - Enfermedades con tratamiento de costo prohibitivo
 - Enfermedades con una amenaza importante para la salud humana (p. ej., rabia)
 - Adelgazamiento extremo y/o debilidad producto de una enfermedad.
 - Dolor y sufrimiento que no pueda controlarse
 - Diagnóstico negativo o recuperación prevista prolongada.
 - Hemorragia incontrolable de un vaso sanguíneo importante